

# Avertissements agricoles

DLP 10-7-84391084




Bulletin Technique n° 21 du 4 juillet 1984

MAIS : la pyrale a beaucoup de retard !  
BLE : infestations localement importantes de pucerons  
COLZA : plus d'intervention avant la récolte  
Repérez les symptômes de sclérotinia

## MAIS : LA PYRALE A BEAUCOUP DE RETARD !

Un début de vol a été constaté en cage d'élevage dans la région d'ANCEMONT en Meuse. Dans les autres secteurs lorrains et en Alsace, le vol n'a pas encore démarré et a donc un retard important. Son déroulement ainsi que les périodes de traitement vous seront précisés dans un prochain bulletin, sur nos répondeurs téléphoniques : Alsace (88) 37.32.21 - Lorraine (8) 337.45.98. et sur celui de la Météorologie Nationale de Meyenheim (89) 81.04.47.

### ● Les zones à risques



On constate une extension du ravageur à des zones jusqu'à présent moins infestées (Sundgau, Pays de Hanau, région de Verdun, et région de Lunéville).

Imprimerie de la Station de STRASBOURG  
Directeur-Gérant : D. CALLU  
Publication Périodique :  
CPPAP N° : 1848 DA  
Abonnement Annuel : 95 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Cité Administrative  
67084 STRASBOURG CEDEX  
ALSACE : (88) 37.32.18  
LORRAINE : (8) 337.26.45



## ● Produits de traitement

L'utilisation des produits en formulation microgranulée, à un stade optimum, doit rester la méthode de base.

### \* Produits en formulation microgranulée

Matière Active	Nom Commercial	Dose/ha de p.c.
bacillus thuringiensis	Bactospéine	30 kg
chlorpyrifos éthyl	Dursban 1,5 G	25 kg
cyperméthrine	Ripcord G	25 kg
deltaméthrine	Décis MG	25 kg
endosulfan	Thiodan 5 G	25 kg
fénitrothion	Dotix	25 kg
parathion éthyl	Kriss 2,5 G	25 kg
perméthrine	Granador Perthrine MG	25 kg
phoxime	Volaton 2,5 Volaton 5	25 kg
profénofos	Pirizol Super 3 G	25 kg
tétrachlorvinphos	Gardona G 5	30 kg
triazophos	Hostathion G2	25 kg

### \* Produits en formulation liquide

Plusieurs formulations liquides (Cymbush, Décis, Kafil Super, Sumicidin) ont reçu une autorisation provisoire de vente en 1983 ; l'attention des utilisateurs doit être attirée sur les pullulations de pucerons qu'elles risquent d'entraîner. Ce phénomène s'est peu manifesté en 1983 mais est plus probable cette année, surtout en situation non irriguée. L'adjonction d'un antipuceron en mélange avec l'une de ces spécialités est déconseillée car elle sera insuffisante pour éviter une pullulation éventuelle de pucerons.

## BLE : INFESTATIONS LOCALEMENT IMPORTANTES DE PUCERONS

Dans certaines parcelles, les populations se sont accrues jusqu'à dépasser le seuil d'intervention. FIDEL est souvent plus infesté que d'autres variétés. Le blé reste sensible jusqu'à la fin du stade laiteux. N'intervenir que si 50 % des épis portent au moins 1 puceron.

## COLZA : PLUS D'INTERVENTION AVANT LA RECOLTE !

A moins de 3 semaines de la récolte, il n'y a plus lieu de traiter contre l'Alternaria ou les pucerons cendrés.

☆☆☆

Des problèmes pratiques nous ont contraint à informatiser rapidement le fichier de nos abonnés. Des erreurs ont pu se glisser lors de la recopie du fichier. Au cas où vous ne receviez pas le prochain bulletin, veuillez nous en informer rapidement. Merci de votre compréhension.

☆☆☆

## COLZA : REPERER LES SYMPTOMES DE SCLEROTINIA

C'est maintenant qu'on peut observer les symptômes de sclérotinia ; les plantes touchées présentent un feutrage blanc sur les tiges qui se dessèchent ensuite.

Pour nous aider à établir une cartographie des zones infestées, indispensable à l'aménagement de la lutte pour 1985 et si vous disposez de colzas non traités contre le sclérotinia, faites nous part de vos observations en nous renvoyant le coupon ci-dessous.

Des abonnements gratuits aux Avertissements Agricoles récompenseront les lères réponses.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Parcelle : Commune :

Si oui, infestation : faible ☐

moyenne ☐

Présence de sclérotinia : oui ☐ non ☐  
élevée ☐

Préciser si des cultures sensibles (colza - tournesol - légumineuses) reviennent souvent dans la rotation.